仔猪断奶后 1 周内血清生化指标、十二指肠形态结构及空肠中钠/葡萄糖共转运载体 1 与二肽转运载体 1 基因表达量的变化

李梦云¹ 聂芙蓉¹ 程伟¹ 朱宽佑¹ 郭良兴¹ 张天勇² 刘延贺^{1*}

(1.河南牧业经济学院动物科技学院,郑州 450046;2.河南广安生物科技股份有限公司,郑州 450001)

摘要: 本试验旨在探讨仔猪在断奶前及断奶后 1 周内血清生化指标、十二指肠形态结构及空肠中钠/葡萄糖共转运载体 1 (*SGLT1*) 和二肽转运载体 1 (*PepT1*) 基因表达量的变化规律。试验选取 20 日龄仔猪 55 头,断奶前 1 天屠宰 5 头,余下 50 头仔猪在 21 日龄断奶,并分为 5 组(圈),每组 10 头仔猪,分别在断奶后第 2、4 和 8 天从每组各挑选 1 头仔猪屠宰。结果表明:1)与断奶前相比,血清碱性磷酸酶活性在断奶后第 2 天显著降低($P<0.05$),在断奶后第 8 天极显著降低($P<0.01$),血清钾离子含量在断奶后第 4 和 8 天显著增加($P<0.05$),血清尿素氮含量在断奶后第 2 天极显著增加($P<0.01$),在断奶后第 8 天又显著降低($P<0.05$),血清免疫球蛋白 G 含量显著降低($P<0.05$)。2)与断奶前相比,十二指肠绒毛高度在断奶后第 2 天极显著降低($P<0.01$),断奶后第 4 天显著降低($P<0.05$),隐窝深度在断奶后第 2 和 4 天均显著增加($P<0.05$),两者比值在断奶后第 2 和 4 天均显著降低($P<0.05$)。3)与断奶前相比,空肠中 *SGLT1* 基因表达量在断奶后均显著降低($P<0.05$),空肠中 *PepT1* 基因表达量在断奶后第 4 和 8 天均显著降低($P<0.05$)。由此表明,断奶 1 周内对仔猪生理机能造成了一定的应激;断奶降低了仔猪血清免疫球蛋白 G 含量,改变了仔猪十二指肠形态结构,降低了空肠中 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因表达量,以断奶后第 2 和 4 天应激最强。

关键词: 仔猪;血清生化指标;肠道形态;基因表达;断奶前后

中图分类号:S828

文献标识码:A

文章编号:1006-267X(2019)02-0757-07

断奶是仔猪出生后面临的最大应激,饲料与环境的改变最终导致仔猪在断奶后采食量降低、负增重、免疫力降低和发病率升高等问题,严重的甚至死亡^[1],其实质则是仔猪肠道损伤、肠道结构和功能发生改变。而仔猪肠道不仅是机体最大的消化器官,更是机体的免疫器官,还是阻挡病原菌入侵的首要屏障^[2],肠道正常的形态结构对维持动物机体的消化和免疫功能至关重要。小肠中钠/葡萄糖共转运载体 1 (sodium-glucose transporter

1, *SGLT1*) 和二肽转运载体 1 (peptide transporter 1, *PepT1*) 分别是转运葡萄糖和寡肽的载体,反映动物机体消化吸收碳水化合物和蛋白质的功能^[3-4]。因而研究仔猪断奶前及断奶后 1 周内血清生化指标、肠道形态及 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因的表达具有重要的意义。关于 *SGLT1*、*PepT1* 基因的研究,多集中在其组织分布、功能及表达调控^[5-6],但针对仔猪断奶前后表达规律,特别是仔猪断奶后 1 周内的生理变化及相关基因的表达规律研究的较

收稿日期:2018-07-06

基金项目:郑州市 1125 创新领军人才项目(2016XL003);校科技创新团队(HUAHE2015005)

作者简介:李梦云(1970—),女,湖北监利人,副教授,博士,从事猪营养研究。E-mail: limengyun1@163.com

* 通信作者:刘延贺,副教授,E-mail: daliul@yaho.com.cn

少。因此,本试验旨在研究仔猪在断奶前及断奶后 1 周内血清生化指标、肠道形态结构及空肠 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因表达差异,为研究仔猪断奶营养调控技术及缓解仔猪断奶应激提供理论基础。

1 材料与方 法

1.1 试验分组与试验动物

选取 20 日龄健康仔猪 55 头,断奶前 1 天屠宰 5 头,余下 50 头仔猪在 21 日龄分成 5 组(圈)进行断奶,每组 10 头仔猪,饲喂常规玉米-豆粕型基础教槽料,日饲喂 4 次,时间分别为 07:00、11:00、15:00 和 21:00,每次以吃饱后食槽中略有余料为度,自由饮水。观察猪只健康状况和清扫猪圈。分别在断奶后第 2、4 和 8 天从每个圈挑选 1 头体重接近的仔猪采血后屠宰,即每次屠宰 5 头仔猪。测定仔猪血清生化指标、十二指肠形态结构以及空肠中 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因表达量,探讨断奶前及断奶后 1 周内仔猪生理指标变化差异及机理。

1.2 测定指标与方法

1.2.1 血清生化指标测定

试验第 1、2、4、8 天,屠宰仔猪前空腹采集静脉血 8 mL,在 4 ℃ 冰箱中静置 6 h,然后 3 000 r/min 离心 15 min,制备血清,-20 ℃ 保存,测定血清碱性磷酸酶(ALP)活性及钠、氯、钾、葡萄糖(GLU)、尿素氮(UN)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 G(IgG)含量,采用日立 7600-020 全自动分析仪(日立高科技公司,日本)测定,所有血清指标委托郑州市颐和医院检验科检测。

1.2.2 小肠黏膜形态结构测定

试验第 1、2、4、8 天,分别取每头仔猪十二指肠中部 2 cm 的肠段,放入 4% 甲醛溶液中固定,经水洗、透明、浸蜡、包埋等处理后,在室温下切成 5 μm 厚的切片,用于形态结构观察。100 倍显微镜下用标尺测量 20 根最长绒毛和相应的隐窝深度。绒毛高度以肠腺开口至绒毛顶端的垂直高度为准,隐窝深度为绒毛根部上皮凹陷到固有层的距离,并计算绒毛长度与隐窝深度比值(V/C)。

1.2.3 空肠中 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因表达量的测定

每头仔猪屠宰时取空肠前端 2 cm 左右的肠段,剪碎后用含 0.1% 焦碳酸二乙酯(DEPC)处理过的磷酸盐缓冲液(PBS)冲洗,装入无 RNA 酶的 1.5 mL 的 EP 管中,迅速在液氮中冷冻,-70 ℃ 保存。采用实时荧光定量 PCR 测定空肠中 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因表达量。

每头仔猪取 100 mg 空肠样品在液氮中充分研磨,收集于 1.5 mL 的 EP 管中,用 RNA 提取试剂盒(SK1312,上海生工)提取总 RNA,用 cDNA 试剂盒(SK2445,上海生工)以提取的总 RNA 为模板进行 RT 反应,然后立即进行实时荧光定量 PCR 反应。*SGLT1*、*PepT1* 基因和内参基因 β -肌动蛋白(β -actin)引物均由上海生工设计并合成,引物序列见表 1。反应体系如下:cDNA 2 μL,SYBR Green Real time PCR Master Mix 10 μL,上游、下游引物各 1 μL,0.1% DEPC 处理水 6 μL。实时荧光定量 PCR 反应程序如下:95 ℃ 3 min,然后 95 ℃ 30 s 进行 40 个循环,最后 70 ℃ 延伸 5 min。分别测定目的基因和内参基因的 Ct 值,用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 方法计算各基因表达量。

表 1 实时荧光定量 PCR 引物序列

Table 1 Primer sequences used for real-time quantitative-PCR

基因 Genes	GenBank 登录号 GenBank accession No.	引物序列 Primer sequences (5'—3')	扩增长度 Amplification size/bp	温度 Temperature/ ℃
钠/葡萄糖共转运载体 1 <i>SGLT1</i>	M34044	F:TTACATCCAGTCTGTCCACCAGTTAC	99	58.0
		R:CAAAAGGCTCCCTCCTCATT		58.4
二肽转运载体 1 <i>PepT1</i>	EU400159	F:AGATGAAATGTGAGCGTATGGG	153	59.3
		R:GCCTTCTTTACTCGGCTGGTT		60.4
β -肌动蛋白 β -actin	U07786	F:AAATCCGTTGGCTGGTTGA	198	58.6
		R:CAAACATCGGGGAAGAAAGG		59.6

1.3 数据处理

采用 SPSS 17.0 统计软件对断奶前和断奶后 1 周内的数据进行方差分析和 Duncan 氏多重比较。试验结果用平均值±标准差表示。 $P<0.05$ 为差异显著, $P<0.01$ 为差异极显著。

2 结果与分析

2.1 仔猪断奶后 1 周内血清生化指标的变化规律

由表 2 可知,与断奶前相比,血清碱性磷酸酶活性在断奶后第 2 天显著降低($P<0.05$),在断奶后第 8 天极显著降低($P<0.01$),血清钾离子含量在断奶后第 4 和 8 天显著增加($P<0.05$),血清尿

素氮含量在断奶后第 2 天极显著增加($P<0.01$),在断奶后第 8 天又显著降低($P<0.05$),血清免疫球蛋白 G 含量断奶后均显著降低($P<0.05$)。其他指标在断奶前后无显著差异($P>0.05$)。

2.2 仔猪断奶后 1 周内十二指肠形态结构的变化规律

由图 1 和表 3 可知,和断奶前相比,十二指肠绒毛高度在断奶后第 2 天极显著降低($P<0.01$),在断奶后第 4 天显著降低($P<0.05$),隐窝深度在断奶后第 2 和 4 天均显著增加($P<0.05$),V/C 在断奶后第 2 和 4 天均显著降低($P<0.05$)。

表 2 仔猪断奶前后血清生化指标

Table 2 Biochemical indices in serum of pre- and post-weaning piglets

项目 Items	断奶前 Pre-weaning	断奶后第 2 天 Day 2 post-weaning	断奶后第 4 天 Day 4 post-weaning	断奶后第 8 天 Day 8 post-weaning
碱性磷酸酶 ALP/(U/L)	501.69±51.49 ^{Aa}	364.75±58.67 ^{ABb}	434.75±65.06 ^{Aa}	277.50±20.75 ^{Bb}
钠 Sodium/(mmol/L)	142.25±2.02	138.50±2.10	139.00±0.82	144.25±3.45
氯 Chlorine/(mmol/L)	99.75±2.28	98.00±1.78	98.75±0.48	102.75±1.03
钾 Potassium/(mmol/L)	5.20±0.29 ^b	5.53±0.13 ^{ab}	6.15±0.72 ^a	6.08±0.37 ^a
葡萄糖 GLU/(mmol/L)	7.25±0.54	6.08±0.58	6.55±0.50	6.83±0.92
尿素氮 UN/(mmol/L)	4.58±0.34 ^{Bb}	7.65±0.33 ^{Aa}	4.50±0.50 ^{Bb}	3.83±0.56 ^{Bc}
总蛋白 TP/(g/L)	52.95±1.49	51.93±1.69	52.30±1.25	51.48±0.56
白蛋白 ALB/(g/L)	31.53±1.52	33.30±2.25	32.25±0.75	32.43±0.27
球蛋白 GLB/(g/L)	20.53±2.33	18.63±2.15	20.05±1.51	19.58±0.97
免疫球蛋白 A IgA/(g/L)	0.01±0.00	0.01±0.00	0.01±0.00	0.01±0.00
免疫球蛋白 G IgG/(g/L)	1.99±0.06 ^a	1.74±0.08 ^b	1.78±0.10 ^b	1.78±0.09 ^b

同行数据肩标不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$),不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。下同。

In the same row, values with different capital letter superscripts mean significant difference ($P<0.01$), and with different small letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$). The same as bellow.

2.3 仔猪断奶后 1 周内空肠 SGLT1 和 PepT1 基因表达量的变化规律

由表 4 可知,与断奶前相比,仔猪空肠中 SGLT1 基因表达量在断奶后均显著降低($P<0.05$),PepT1 基因表达量在断奶后第 4 和 8 天均显著降低($P<0.05$)。

3 讨论

3.1 仔猪断奶后 1 周内血清生化指标的变化规律

机体血液指标可反映动物生理机能和健康状况,有研究表明仔猪断奶会导致仔猪血液指标的变化^[7]。朱孟玲等^[8]选取 5 日龄断奶的小梅山仔猪和长梅仔猪,分别于断奶时、断奶后 1、3 和 5 d

测定血清生化指标,发现断奶后血清中白蛋白、球蛋白含量显著降低。本试验结果表明,断奶后血清球蛋白含量也降低,但没有达到显著的水平,说明断奶应激对仔猪免疫功能有一定的影响。本试验还发现,血清碱性磷酸酶活性在断奶前最高,断奶后第 2 和 8 天显著或极显著降低,这与朱孟玲等^[8]的研究结果不一致,他们发现血清碱性磷酸酶活性在不同品系中的结果不一,即纯种猪,断奶应激对血清碱性磷酸酶活性无显著影响,而在杂交仔猪中,断奶后血清中其活性显著上升。Melo 等^[9]最新研究表明,小肠碱性磷酸酶可抑制肠道菌群移位及炎症产生,进而有利用仔猪肠道健康。Lackeyram 等^[10]在断奶仔猪上的研究表明,断奶

可降低碱性磷酸酶蛋白表达量和碱性磷酸酶活性,这间接表明碱性磷酸酶可促进肠道健康,提高养分的吸收利用率。而本试验结果也表明了断奶对仔猪肠道健康有一定的危害。造成结果不一致的原因可能在于猪的品种、年龄及所用的饲料类型不同。血清尿素氮含量反映了蛋白质吸收的效率,可以准确地反映动物机体内蛋白质代谢和氨基酸之间的平衡状况^[11],氨基酸平衡良好时,尿素氮含量下降,尿素氮含量越低则说明氮的利用率越高。本试验中,断奶后第2天血清尿素氮含量最高,表明蛋白质的消化吸收最差。

图1 仔猪断奶前后十二指肠绒毛形态结构

Fig.1 Morphology of duodenum in pre- and post-weaning piglets

3.2 仔猪断奶后1周内十二指肠形态结构的变化规律

小肠是营养物质吸收利用的主要场所,肠绒毛高度和隐窝深度反映小肠的功能状态,绒毛高度越高,隐窝深度越浅越利于饲料中营养物质的吸收。断奶应激使得仔猪采食量下降和营养缺乏,进而导致肠道的结构和功能受损,主要表现为断奶后肠道绒毛萎缩和隐窝增生^[12]。

任曼等^[13]测定了仔猪21日龄断奶及断奶后14 d 十二指肠和空肠的绒毛高度和隐窝深度,发现断奶后14 d 的十二指肠绒毛高度显著增加,隐窝深度无显著差异。但他们没有测定断奶后1周内仔猪肠道结构的变化。Tang 等^[14]的研究结果表

明,和断奶前相比,断奶后3 d 小肠绒毛及V/C 极显著降低,隐窝深度极显著增加。Cera 等^[15]早期的研究结果也表明,断奶后第3天绒毛高度比断奶时下降65.3%,这与本试验研究结果较为一致,本试验结果表明,十二指肠绒毛高度在断奶后第2天极显著降低,断奶后第4天显著降低,隐窝深度在断奶后第2和4天均显著增加,V/C 在断奶后第2和4天均显著降低。小肠绒毛高度及隐窝深度的改变影响机体能量和蛋白质代谢^[16]。

3.3 仔猪断奶后1周内相关功能基因表达的变化规律

SGLT1 位于小肠上皮刷状缘膜表面,是主动转运葡萄糖进入小肠上皮细胞内部的关键载体^[17]。研究表明,SGLT1 的表达决定小肠转运葡萄糖的效率^[18]。研究表明,SGLT1 在整个哺乳期保持较高水平,断奶后显著下降^[19]。张磊等^[20]比较了新淮猪在断奶前1周、断奶后3 d、断奶后1周和断奶后10 d 空肠中 SGLT1 基因表达的变化情况,发现断奶后3 d SGLT1 基因表达量和断奶前及断奶当天差异不显著,但在断奶后第7天显著降低,比断奶前下降了49.3%,断奶后第10天虽然有所增加,但仍显著低于断奶前、断奶当天及断奶后第3天时的表达量。本试验结果表明,仔猪空肠中 SGLT1 基因表达量在断奶前显著高于断奶后的第2、4和8天,SGLT1 基因表达量在断奶后第2天就显著下降,而张磊等^[20]的研究结果表明 SGLT1 基因表达量在断奶1周后才开始下降。张帅等^[21]在断奶仔猪上的研究表明,空肠中 SGLT1 基因表达量在断奶后先降低,断奶后第3天开始升高。造成这些结果不一致的原因可能在于所选猪的品种、测定的日龄以及环境不同所致,但研究结果均表明了仔猪断奶后 SGLT1 基因表达量会显著降低,这也就阐明了仔猪断奶后1周内糖代谢水平显著下降的机理所在。

饲料蛋白质在肠道的主要消化产物是游离氨基酸和寡肽(二肽和三肽),PepT1 基因主要在消化道中表达,对寡肽的吸收起关键性作用。邹仕庚等^[22]分别测定了1、7、26、30、60、90和150日龄蓝塘和长白猪肠道 PepT1 基因表达量,发现2品种猪空肠中 PepT1 基因表达量在30日龄即断奶后第2天最低,显著低于断奶前(26日龄)和60日龄仔猪,说明断奶可显著降低 PepT1 基因表达量。本研究结果也表明,仔猪断奶后第2天 PepT1 基

因表达量最低,表明断奶也影响机体蛋白质代谢。最近的研究表明 *PepT1* 可通过调控小肠隐窝-绒毛轴而维持肠道健康^[23],进一步证实了仔猪断奶

后 *PepT1* 基因表达量降低,对肠道健康有负面影响。

表 3 仔猪断奶前后十二指肠形态结构

Table 3 Morphology of duodenum in pre- and post-weaning piglets

项目 Items	断奶前 Pre-weaning	断奶后第 2 天 Day 2 post-weaning	断奶后第 4 天 Day 4 post-weaning	断奶后第 8 天 Day 8 post-weaning
绒毛高度 Villus height/ μm	338.04 $\pm$ 47.09 ^{Aa}	211.78 $\pm$ 6.29 ^{Bc}	260.59 $\pm$ 21.94 ^{ABb}	299.63 $\pm$ 20.78 ^{Aa}
隐窝深度 Crypt depth/ μm	202.75 $\pm$ 4.02 ^b	268.35 $\pm$ 24.66 ^a	277.59 $\pm$ 16.00 ^a	224.89 $\pm$ 26.88 ^b
绒毛高度/隐窝深度 V/C	1.67 $\pm$ 0.26 ^a	0.79 $\pm$ 0.05 ^b	0.94 $\pm$ 0.16 ^b	1.33 $\pm$ 0.22 ^a

表 4 仔猪断奶前后空肠 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因表达量

Table 4 Gene expression levels of *SGLT1* and *PepT1* of jejunum in pre- and post-weaning piglets

基因 Genes	断奶前 Pre-weaning	断奶后第 2 天 Day 2 post-weaning	断奶后第 4 天 Day 4 post-weaning	断奶后第 8 天 Day 8 post-weaning
钠/葡萄糖共转运载体 1 <i>SGLT1</i>	0.93 $\pm$ 0.16 ^a	0.57 $\pm$ 0.12 ^b	0.52 $\pm$ 0.17 ^b	0.54 $\pm$ 0.05 ^b
二肽转运载体 1 <i>PepT1</i>	0.96 $\pm$ 0.04 ^a	0.82 $\pm$ 0.11 ^{ab}	0.63 $\pm$ 0.02 ^b	0.70 $\pm$ 0.10 ^b

4 结 论

本试验结果表明了断奶 1 周内对仔猪生理机能造成了一定的应激,降低了仔猪血清中免疫球蛋白 G 含量,改变了仔猪十二指肠形态结构,降低了空肠中 *SGLT1* 和 *PepT1* 基因表达量,尤其以断奶后第 2 和 4 天应激最强。

参考文献:

[1] LE DIVIDICH J, SÈVE B. Effects of underfeeding during the weaning period on growth, metabolism, and hormonal adjustments in the piglet [J]. Domestic Animal Endocrinology, 2000, 19(2) : 63-74.

[2] PLUSKE J R, HAMPSON D J, WILLIAMS I H. Factors influencing the structure and function of the small intestine in the weaned pig: a review [J]. Livestock Production Science, 1997, 51(1/2/3) : 215-236.

[3] WRIGHT E M, HIRSCH J R, LOO D D, et al. Regulation of Na⁺/glucose cotransporters [J]. Journal of Experimental Biology, 1997, 200(2) : 287-293.

[4] SHEN H, SMITH D E, BROSIUS III F C. Developmental expression of *PEPT1* and *PEPT2* in rat small intestine, colon, and kidney [J]. Pediatric Research, 2001, 49(6) : 789-795.

[5] 黄志毅, 邹仕庚, 职爱民, 等. 猪肠道葡萄糖转运载体

mRNA 表达的组织分布特异性 [C] // 中国畜牧兽医学动物营养学分会第十次学术研讨会. 杭州: 中国畜牧兽医学动物营养学分会, 2008.

[6] 魏巍, 刘洪杰, 何仲贵. 靶向肠道寡肽转运体 1 (*PepT1*) 前药的研究进展 [J]. 沈阳药科大学学报, 2017, 34(9) : 788-795.

[7] 吴金节, 龙彩虹, 张德群, 等. 早期断奶应激对仔猪血清生化指标的影响 [J]. 中国兽医学报, 2000, 20(3) : 261-263.

[8] 朱孟玲, 徐孝宙, 张建生, 等. 小梅山猪及其二元杂交猪断奶前后血液指标的检测 [J]. 畜牧与兽医, 2011, 43(7) : 66-69.

[9] MELO A D B, SILVEIRA H, LUCIANO F B, et al. Intestinal alkaline phosphatase: potential roles in promoting gut health in weaning piglets and its modulation by feed additives-a review [J]. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 2016, 29(1) : 16-22.

[10] LACKEYRAM D, YANG C B, ARCHBOLD T, et al. Early weaning reduces small intestinal alkaline phosphatase expression in pigs [J]. The Journal of Nutrition, 2010, 140(3) : 461-468.

[11] KOHN R A, DINNEEN M M, RUSSEK-COHEN E. Using blood urea nitrogen to predict nitrogen excretion and efficiency of nitrogen utilization in cattle, sheep, goats, horses, pigs, and rats [J]. Journal of Animal Science, 2005, 83(4) : 879-889.

- [12] 李德发.猪的营养[M].北京:北京农业大学出版社, 1996;365-368
- [13] 任曼,霍应峰,杨凤娟,等.仔猪断奶前后肠道形态和相关免疫蛋白基因表达的变化[J].动物营养学报, 2014,26(3):614-619.
- [14] TANG M, LAARVELD B, VAN KESSEL A G, et al. Effect of segregated early weaning on postweaning small intestinal development in pigs [J]. *Journal of Animal Science*, 1999, 77(12):3191-3200.
- [15] CERA K R, MAHAN D C, CROSS R F, et al. Effect of age, weaning and postweaning diet on small intestinal growth and jejunal morphology in young swine [J]. *Journal of Animal Science*, 1988, 66(2):574-584.
- [16] YANG H S, XIONG X, WANG X C, et al. Effects of weaning on intestinal crypt epithelial cells in piglets [J]. *Scientific Reports*, 2017, 6:36939.
- [17] WRIGHT E M. Renal Na⁺-glucose cotransporters [J]. *American Journal of Physiology Renal Physiology*, 2001, 280(1):F10-F18.
- [18] RODRIGUEZ S M, GUIMARAES K C, MATTHEWS J C, et al. Influence of abomasal carbohydrates on small intestinal sodium-dependent glucose cotransporter activity and abundance in steers [J]. *Journal of Animal Science*, 2004, 82(10):3015-3023.
- [19] CAO M, CHE L Q, WANG J, et al. Effects of maternal over- and undernutrition on intestinal morphology, enzyme activity, and gene expression of nutrient transporters in newborn and weaned pigs [J]. *Nutrition*, 2014, 30(11/12):1442-1447.
- [20] 张磊,王丽娜,石志敏,等.断奶前后仔猪十二指肠、空肠和回肠 *SGLT1* mRNA 表达的变化及半胱胺的影响[J].农业生物技术学报, 2006, 14(6):850-854.
- [21] 张帅,刘婷婷,周琳,等.断奶仔猪小肠钠葡萄糖转运蛋白 1 和葡萄糖转运蛋白 2 mRNA 表达变化及饲料添加谷氨酰胺对其的影响[J].动物营养学报, 2011, 23(6):983-990.
- [22] 邹仕庚,冯定远,黄志毅,等.猪肠道寡肽转运载体 1 (*PepT1*) mRNA 表达的肠段特异性和发育性变化[J].农业生物技术学报, 2009, 17(2):229-236.
- [23] ZHANG Y C, VIENNOIS E, ZHANG M Z, et al. *PepT1* expression helps maintain intestinal homeostasis by mediating the differential expression of miRNAs along the crypt-villus axis [J]. *Scientific Reports*, 2016, 6:27119.

Changes in Serum Biochemical Indices, Duodenal Morphology, Expression Levels of SGLT1 and PepT1 Genes in Jejunum of Piglets at the First Week Post-Weaning

LI Mengyun¹ NIE Furong¹ CHENG Wei¹ ZHU Kuanyou¹ GUO Liangxing¹
ZHANG Tianyong² LIU Yanhe^{1*}

(1. College of Animal Science and Technology, Henan University of Animal Husbandry and Economy, Zhengzhou 450046, China; 2. Henan Guang An Bio-Tech Co., Ltd, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: The experiment was conducted to investigate the changes in serum biochemical indices, duodenal morphology and expression levels of sodium-glucose transporter 1 (*SGLT1*) and peptidetransporter 1 (*PepT1*) genes in jejunum of piglets at pre-weaning and the first week post-weaning. A total of 55 piglets at 20 days of age were selected, five piglets were slaughtered at 1 d pre-weaning, and the remained 50 piglets (weaned at 21 days of age) were randomly divided to 5 groups (pens) with 10 piglets per pen. One piglet per pen was sacrificed on d 2, 4 and 8 post-weaning, respectively. The results showed as follows: 1) compared with pre-weaning, the alkaline phosphatase activity in serum on d 2 post-weaning was significantly decreased ($P < 0.05$) and was very significantly decreased on d 4 post-weaning ($P < 0.01$); serum potassium ion content was significantly increased on d 4 and 8 post-weaning ($P < 0.05$); serum urea nitrogen content was very significantly increased on d 2 post-weaning ($P < 0.01$) and significantly decreased on d 8 post-weaning ($P < 0.05$); serum immunoglobulin G content was significantly decreased after weaning ($P < 0.05$). 2) Compared with pre-weaning, the duodenal villus height was significantly decreased on d 2 post-weaning ($P < 0.01$) and d 4 post-weaning ($P < 0.05$), crypt depth in duodenum was significantly enhanced on d 2 and 4 post-weaning ($P < 0.05$), and the ratio of villus height to crypt depth was also significantly decreased on d 2 and 4 post-weaning ($P < 0.05$). 3) Compared with pre-weaning, the expression levels of *SGLT1* gene in jejunum was also significantly decreased after weaning ($P < 0.05$); the expression level of *PepT1* gene in jejunum on d 4 and 8 post-weaning was significantly decreased ($P < 0.05$). These results suggest that weaning on the first week causes a certain stress on physiological functions of piglets. Weaning reduces the serum immunoglobulin G content, changes the duodenal morphology, decreases the expression levels of *SGLT1* and *PepT1* genes in jejunum, which may affect the digestion and absorption of carbohydrates and proteins, especially on d 2 and 4 post-weaning. [*Chinese Journal of Animal Nutrition*, 2019, 31(2):757-763]

Key words: piglets; serum biochemical indices; intestinal morphology; gene expression; pre- and post-weaning