饲料胆固醇水平对克氏原螯虾生长性能、 消化酶活性、抗氧化能力和脂代谢 相关基因表达的影响

田红艳¹ 杨成聪¹ 张春暖² 王爱民^{1*} 刘飞¹杨文平¹ 於叶兵¹ 任胜杰¹ 张武肖¹

(1.盐城工学院海洋与生物工程学院,盐城 224000;2.河南科技大学动物科技学院,洛阳 471023)

摘要: 本试验通过6周的养殖试验研究饲料胆固醇水平对克氏原螯虾(*Procambarus clarkii*)生长性能、体组成、消化酶活性、抗氧化能力和脂代谢相关基因表达的影响。试验配制胆固醇添加水平分别为0(C0)、0.25%(C0.25)、0.50%(C0.50)、0.75%(C0.75)、1.00%(C1.00)的5种等氮试验饲料,饲料中胆固醇实测水平分别为0.06%、0.29%、0.54%、0.81%和1.05%。将225尾克氏原螯虾[初重(4.4±0.1)g]随机分为5组,每组3个重复,每个重复15尾虾。养殖6周后采样进行检测。结果表明:1)随着饲料胆固醇水平从0增加到0.50%,克氏原螯虾增重率和肝胰腺、胃及肠道的脂肪酶活性显著上升($P<0.05$),随着胆固醇水平的继续增加而显著下降($P<0.05$)。饲料胆固醇水平并未显著影响克氏原螯虾水分、粗蛋白质、粗灰分和钙含量($P>0.05$),但饲料胆固醇水平低于0.50%时,粗脂肪含量显著下降($P<0.05$)。2)与血淋巴液中丙二醛(MDA)含量相反,血淋巴液中超氧化物歧化酶(SOD)活性随着饲料胆固醇水平由0增加到0.50%而显著上升($P<0.05$),但随着饲料胆固醇水平继续增加而显著下降($P<0.05$)。3)与C0组相比,肝胰脏中肉碱棕榈酰转移酶-I(CPT-I)mRNA相对表达量随着饲料胆固醇水平增加而显著下降($P<0.05$);肝胰脏中脂肪酸结合蛋白(FABP)与脂肪酸转运蛋白(FATP)mRNA相对表达量在胆固醇添加组显著升高($P<0.05$)。由此结果得出,饲料中添加0.50%胆固醇能够促进克氏原螯虾的生长,提高消化组织的脂肪酶活性。饲料中添加胆固醇会抑制脂肪的 β -氧化,增加脂肪酸转运,从而影响脂肪代谢,最终增加克氏原螯虾的脂肪沉积。此外,过低或过量的胆固醇均会降低克氏原螯虾血淋巴液的抗氧化能力。综上所述,本试验中克氏原螯虾饲料的胆固醇适宜添加水平为0.50%,此时饲料胆固醇实测水平为0.54%。

关键词: 克氏原螯虾;胆固醇;生长;脂代谢;抗氧化

中图分类号:S963

文献标识码:A

文章编号:1006-267X(2022)07-4630-12

胆固醇是动物体内一种重要的固醇类化合物,不仅是动物细胞膜的组成成分,还是包括类固醇激素、胆汁酸和维生素D在内的众多功能性生

理物质的前体^[1]。鱼类等大多数脊椎动物能够利用乙酸通过甲羟戊酸合成、异戊二酸合成、鲨烯合成以及胆固醇生成4个生理过程合成胆固醇。但

收稿日期:2021-12-26

基金项目:江苏省高等学校自然科学研究面上项目(20KJB240003);盐城工学院高层次人才科研启动项目(xjr2019049);中国盐城渔业高质量发展课题(YCSCYJ2021021);江苏现代农业(克氏原螯虾)产业技术体系营养与饲料创新团队项目(JATS[2021517])

作者简介:田红艳(1989—),女,江苏无锡人,讲师,博士,主要从事水产动物营养与饲料以及甲壳动物蜕皮机制研究。E-mail: tianhy@outlook.com

*通信作者:王爱民,教授,硕士生导师,E-mail: bluesewam@ycit.cn

虾蟹等甲壳类动物已被证明不能从头合成甾醇^[2],必须摄入外源性胆固醇来维持正常生理机能。因此,对于人工养殖的虾蟹类动物而言,饲料中的胆固醇是其获得胆固醇的最主要来源,对于其维持自身良好生长和正常的生理功能具有重要意义。

饲料胆固醇主要由鱼油、鱼粉等原料提供,常用鱼油与鱼粉的胆固醇水平通常在 0.1%~0.7%^[1],以这些原料来补充配合饲料中的胆固醇会增加鱼粉、鱼油使用量,大大增加饲料和养殖成本。此外,随着鱼粉等渔业资源的紧张,配合饲料中鱼粉已逐渐被其他蛋白质原料替代,导致虾蟹动物配合饲料的胆固醇水平逐渐下降。因而,确定配合饲料中胆固醇这一基本营养素的需求对制定成本低、效益高的甲壳动物专用饲料变得越来越重要。克氏原螯虾(*Procambarus clarkii*)是我国近几年迅速发展起来的一类水产品,2020 年我国克氏原螯虾养殖总产量将近 240 万 t,是继五大宗淡水鱼品种后的第六大淡水养殖品种^[3],因此饲料需求量也随着养殖规模的增加而逐年增加。绝大多数学者认为克氏原螯虾所需配合饲料蛋白质水平在 26%~32%^[4],而其中鱼粉用量低于 5%。由于常见虾蟹类动物的胆固醇需求量一般在 0.5%~1.0%^[5-6],因而克氏原螯虾配合饲料中胆固醇水平可能远远不能满足自身所需。

本课题组前期研究发现,克氏原螯虾饲料中添加 0.50%~0.75% 的胆固醇可以有效增加蜕壳次数,提高生长性能^[7]。但同时也发现,克氏原螯虾体内各组织胆固醇含量及血淋巴液中高密度脂胆固醇含量也随着饲料胆固醇添加水平的增加而不断增加。在拟穴青蟹(*Scylla paramamosain*)的研

究中也发现,肝脏中总胆固醇含量随着饲料胆固醇水平的增加而不断增加^[8]。胆固醇作为感应机体内脂肪细胞能量储存状态的信号分子,过量的胆固醇很可能会影响机体正常脂肪代谢。因此,本试验在前期研究基础上,进一步探究饲料胆固醇对克氏原螯虾生长性能、体组成、消化酶活性、抗氧化能力和脂代谢相关基因表达的影响。本试验所得研究结果将对胆固醇促进虾蟹类生长的机理进行探讨,为今后开发克氏原螯虾专用配合饲料提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物

试验用克氏原螯虾初重(4.4±0.1) g,购自盐城市大丰区某小龙虾养殖场,选择个体健康灵活,大小规格一致。投喂普通商品饲料,驯化 1 周。

1.2 试验饲料

在 3% 鱼粉的基础上设计分别添加 0 (C0 组)、0.25% (C0.25 组)、0.50% (C0.50 组)、0.75% (C0.75 组)、1.00% (C1.00 组) 胆固醇(纯度 99.99%) 的 5 种等氮试验饲料(饲料中胆固醇实测水平分别为 0.06%、0.29%、0.54%、0.81%、1.05%)。饲料原料购自盐城某饲料有限公司,原料先经过粉碎机粉碎然后 80 目过筛,所有原料称重后最后逐级放大法均匀混合,胆固醇添加组需要将胆固醇均匀溶于豆油后,再与其他饲料原料混匀,混匀过程中以喷壶均匀喷洒水(按照 16% 质量分数添加水分),各原料充分混匀后使用饲料制粒机生产口径为 2 mm 的颗粒饲料,在室温下饲料风干至恒重,密封冷藏备用。试验饲料组成及营养水平见表 1。

表 1 试验饲料组成及营养水平(干物质基础)

Table 1 Composition and nutrient levels of experimental diets (DM basis)

%

项目 Items	组别 Groups				
	C0	C0.25	C0.50	C0.75	C1.00
原料 Ingredients					
鱼粉 Fish meal	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
豆粕 Soybean meal	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
菜籽粕 Rapeseed meal	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
虾粉 Shrimp powder	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
肉粉 Meat meal	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
花生粕 Peanut meal	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
血粉 Blood meal	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
玉米干酒糟及其可溶物 Corn DDGS	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00

续表 1

项目 Items	组别 Groups				
	C0	C0.25	C0.50	C0.75	C1.00
面粉 Wheat flour	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
米糠 Rice bran	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
豆油 Soybean oil	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00
磷酸二氢钙 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
预混料 Premix ¹⁾	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
粘合剂 Cement	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
食盐 NaCl	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
乌贼膏 Squid paste	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
赖氨酸 Lys	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58
膨润土 Bentonite	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
胆固醇 Cholesterol		0.25	0.50	0.75	1.00
合计 Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
营养水平 Nutrient levels ²⁾					
粗蛋白质 Crude protein	27.17	27.34	27.21	27.44	27.15
粗脂肪 Crud lipid	5.97	5.87	6.02	6.04	6.11
总能 GE/(kJ/g)	11.46	11.54	11.56	11.49	11.61
胆固醇 Cholesterol	0.06	0.29	0.54	0.81	1.05

1) 预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 12 500 IU, VB₁ 3.5 mg, VB₂ 21 mg, VB₆ 18 mg, VB₁₂ 0.4 mg, VD₃ 2 800 IU, VE 65 mg, VK 5.5 mg, 生物素 biotin 1.8 mg, 叶酸 folic acid 3.4 mg, 肌醇 inositol 870 mg, 泛酸钙 calcium pantothenate 48 mg, FeSO₄ · 7H₂O 135 mg, CuSO₄ · 5H₂O 20 mg, MnSO₄ · H₂O 55 mg, KI 0.4 mg, MgSO₄ · 7H₂O 4 mg。

2) 营养水平为计算值。Nutrient levels were calculated values.

1.3 试验设计及饲养管理

将 225 尾克氏原螯虾随机分为 5 组, 每组 3 个重复, 每个重复 15 尾虾, 每只单独放置于试验水箱中, 每个水箱长 25 cm、宽 12 cm、高度 15 cm, 并且有孔, 每个重复中的水箱放置于 1 个大水箱中使其水质相同, 大水箱为塑料水箱, 内尺寸长 88.5 cm、宽 66.5 cm、高 66.0 cm, 养殖期间大水箱水位在 12~15 cm。试验期间每天投喂 2 次, 分别在 07:00 和 19:00, 参照 3%~5% 的克氏原螯虾体重进行喂食, 养殖一共持续 6 周。在养殖期间, 养殖水体水温 (23.00±1.84) °C, 以增氧泵维持溶氧含量大于 6.0 mg/L, 每天使用水质检测试剂盒监测水质, pH 保持在 7.2~7.8, 氨态氮含量小于 0.10 mg/L, 硝态氮含量小于 0.06 mg/L, 光照周期为自然光照周期。

1.4 样品采集

采样前禁食 24 h, 克氏原螯虾用酒精消毒的纱布擦干体表水分然后测其体重, 每个重复随机选 3 尾解剖采集腹部肌肉样品并称重, 并取 3 尾

全虾放到 -20 °C 冰箱中保存以待分析。

血淋巴液的采样: 采样前禁食 24 h, 每个重复随机取 3 尾克氏原螯虾用酒精消毒纱布擦干体表水分, 心脏采血, 放入肝素钠润湿过的离心管中, 静置 4 h 后在 4 °C、3 000 r/min 的条件下离心 10 min, 取上清液于 -80 °C 保存待测。

组织液的采样: 采样前禁食 24 h, 每个重复取 5 尾虾, 采肝胰腺、胃、肠道。用 0.85% 生理盐水按 1:4 (重量: 体积) 比例, 捣碎后移入匀浆器中制备 20% 的组织匀浆液。4 °C 低温离心 (2 500 r/min) 10 min, 取上清液 -20 °C 保存待测。

1.5 指标测定方法

$$\text{增重率 (weight gain rate, WGR, \%)} = 100 \times (W_f - W_i) / W_i;$$

$$\text{饲料系数 (feed conversion rate, FCR)} = G_d / (W_f - W_i);$$

$$\text{存活率 (survival rate, SR, \%)} = 100 \times K_t / K_0;$$

$$\text{肥满度 (condition factor, CF, g/cm}^3\text{)} = (W_f - W_i) / A^3;$$

含肉率 (rate of flesh content, RFC, %) =
 $100 \times M_f / W_f$;

肝体比 (hepatosomatic index, HSI, %) =
 $100 \times G_h / W_f$ 。

式中: G_h 为克氏原螯虾肝脏湿重 (g); W_f 和 W_i 分别为克氏原螯虾的终末体重和初始体重 (g); A 为体长 (cm); G_d 为摄入饲料干重 (g); M_f 为克氏原螯虾的终末肌肉重 (g); K_i 和 K_e 分别为试验结束和开始时试验池中克氏原螯虾的数量。

体组成: 采用 (105±2) °C 烘箱烘至恒重的方法直接测定水分含量 (GB/T 5009.3—2016); 采用半微量凯氏定氮法测定粗蛋白质含量 (GB/T 5009.5—2016); 采用索氏提取法测定粗脂肪含量 (GB/T 5009.6—2016); 采用马弗炉 550 °C 灼烧法测定粗灰分含量 (GB/T 5009.4—2016)。

消化酶活性: 测定克氏原螯虾肠道、胃、肝胰腺的蛋白酶 (protease, PR)、淀粉酶 (amylase, AMS) 和脂肪酶 (lipase, LPS) 活性, 采用南京建成生物工程研究所试剂盒测定。

血淋巴生化指标: 谷丙转氨酶 (alanine transaminase, ALT)、谷草转氨酶 (aspartate aminotransferase, AST) 活性和总蛋白 (total protein, TP)、白蛋白 (albumin, ALB) 含量均使用南京建成生物工程研究所试剂盒测定。

血清抗氧化指标: 检测克氏原螯虾血清中超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase, SOD)、过氧

化氢酶 (catalase, CAT) 活性以及丙二醛 (malondialdehyde, MDA)、谷胱甘肽 (glutathione, GSH) 含量, 采用南京建成生物工程研究所试剂盒测定。

饲料胆固醇水平: 用三氯甲烷提取试样中的胆固醇, 以氮气作为流动相, 用气相色谱法分离测定^[9]。

基因表达量: 利用 Trizol 试剂法来抽提肝胰腺中的总 RNA, 随后通过 NanoDrop® ND-1000 分光光度计进行定量 (260 nm 吸收峰)。纯化后的 RNA 使用 ExScript™ RT-PCR kit 反转录成 cDNA。在反转录完成后, 使用 SYBR® Premix Ex Taq™ 试剂盒, 采用实时荧光定量 PCR 测定肝胰腺中肉碱棕榈酰转移酶-I (carnitinepalmitoyl-transferase-I, CPT-I)、脂肪酸合成酶 (fatty acid synthetase, FAS)、脂肪酸转运蛋白 (fatty acid transport protein, FATP)、脂肪酸结合蛋白 (fatty acid binding protein, FABP) mRNA 相对表达量。总反应体系为 20 μL, 包括 cDNA 2 μL、正和反引物各 0.4 μL、SYBR® Premix Ex Taq™ 10 μL、ROX Reference Dye II 0.4 μL 以及二乙基焦碳酸酯 (DEPC) 处理水 6.8 μL。实时荧光定量 PCR 的测定使用 7900HT Fast Real-Time PCR 系统 (Applied Biosystem, 美国), 系统温度达到 95 °C 后, 保持 95 °C 15 s、60 °C 40 s 反应 40 个循环, 随后 65 °C 保持。待测基因的特定引物列于表 2, 引物由 Primer 5 软件进行设计。以 2^{-ΔΔCt} 计算目的基因的 mRNA 相对表达量, 以 β-肌动蛋白为内参基因。

表 2 实时荧光定量 PCR 所用引物

Table 2 Primers used in RT-qPCR

基因名称 Gene names	上游引物序列 Forward primer sequence (5'—3')	下游引物序列 Revised primer sequence (5'—3')
肉碱棕榈酰转移酶-I CPT-I	TCCTTCGCCATCACTCAC	GATTTACTCATTGTTCTCCC
脂肪酸合成酶 FAS	GGAAGAAGAGTGGGAAGC	GACCGAAGTAGTGCCTGA
脂肪酸转运蛋白 FATP	GAACAACCACCTCTGAAAGC	ATGCCTGGACAACCCATA
脂肪酸结合蛋白 FABP	TGTGGGTCTAGTGATGAGG	ACTTTACTTCCGTTGTCTT
β-肌动蛋白 β-actin	GAGGTTGCTGCCCTGGTT	TAGCGGGAGTGTTGAAAG

1.6 数据统计与分析

用 SPSS 19.0 软件的 one-way ANOVA 程序对本试验所得数据进行分析, 显著性差异水平为 $P < 0.05$, 所得试验数据以“平均值±标准误” (mean±

SE) 表示。以克氏原螯虾饲料系数为因变量 (Y), 以饲料胆固醇水平为自变量 (X) 做折线模型, 分析克氏原螯虾饲料胆固醇水平与饲料系数之间的关系。

2 结果

2.1 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾生长性能的影响

由表3可知,随着饲料胆固醇水平由0增加到0.50%,克氏原螯虾增重率显著增加($P<0.05$),但随着胆固醇水平继续增加到1.00%,增重率又显著下降($P<0.05$)。当克氏原螯虾摄食不添加胆固醇

的饲料时,含肉率、肥满度和肝体指数显著低于C0.50、C0.75、C1.00组($P<0.05$)。以克氏原螯虾饲料系数为 Y 轴,以饲料中胆固醇水平为 X 轴,通过折线模型分析得出 $y = -0.22x + 1.2217$ ($R^2 = 0.9356$)与 $y = 0.4x + 0.89$ ($R^2 = 0.7874$)的交点处的 X 为0.54%,此时克氏原螯虾饲料系数最低,饲料利用率最高(图1)。

表3 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾生长性能的影响

Table 3 Effects of dietary cholesterol level on growth performance of *Procambarus clarkii*

项目 Items	组别 Groups					P 值
	C0	C0.25	C0.50	C0.75	C1.00	P-value
初始体重 IW/g	4.45±0.01	4.46±0.03	4.39±0.01	4.46±0.02	4.42±0.02	0.116
终末体重 FW/g	10.09±0.25 ^c	11.44±0.66 ^{abc}	12.60±0.04 ^a	12.01±0.29 ^{ab}	10.52±0.14 ^{bc}	0.003
增重率 WGR/%	126.58±5.73 ^c	156.15±13.01 ^{abc}	187.39±1.67 ^a	169.17±7.16 ^{ab}	138.27±2.41 ^{bc}	0.001
饲料系数 FCR	1.23±0.07 ^{ab}	1.15±0.05 ^{ab}	1.12±0.02 ^b	1.13±0.02 ^b	1.32±0.03 ^a	0.029
存活率 SR/%	90.91±5.25	87.88±8.02	81.82±5.25	87.88±3.03	93.94±3.03	0.590
含肉率 RFC/%	11.03±0.17 ^a	11.62±0.17 ^{ab}	12.59±0.15 ^c	12.33±0.27 ^{bc}	12.28±0.20 ^{bc}	0.001
肥满度 CF/(g/cm ³)	2.80±0.08 ^a	2.94±0.06 ^{ab}	3.15±0.05 ^b	3.14±0.05 ^b	3.13±0.04 ^b	0.005
肝体指数 HSL/%	7.11±0.12 ^a	8.01±0.21 ^b	8.72±0.17 ^c	9.25±0.24 ^c	9.39±0.25 ^c	0.001

同行数据肩标不同小写字母表示显著差异($P<0.05$)。下表同。

Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$). The same as below.

图1 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾饲料系数的影响

Fig.1 Effects of dietary cholesterol level on feed conversion rate of *Procambarus clarkii*

2.2 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾体组成的影响

由表4可知,饲料中胆固醇水平对克氏原螯虾全虾的水分、粗蛋白质、粗灰分和钙含量并未造成显著影响($P>0.05$),但是显著影响了粗脂肪含量($P<0.05$)。随着饲料胆固醇水平从0增加到1.00%,克氏原螯虾粗脂肪含量显著增加($P<0.05$),C0.50、C0.75、C1.00组的粗脂肪含量显著高于C0、C0.25组($P<0.05$)。

2.3 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾各组织消化酶活性的影响

由表5可知,饲料中胆固醇水平对克氏原螯虾的肝胰腺、胃、肠道的脂肪酶、蛋白酶活性有显著影响($P<0.05$),而对各组织的淀粉酶活性无显著差异($P>0.05$)。随着饲料胆固醇水平从0增加到0.50%,肝胰腺、胃以及肠道的脂肪酶活性显著上升($P<0.05$),但随着饲料胆固醇水平的继续增加而显著下降($P<0.05$),C0.50组肝胰腺、胃脂肪酶活性均显著高于其他各组($P<0.05$)。胃和肠道蛋白酶活性随着饲料胆固醇水平从0增加到0.50%而显著上升($P<0.05$),但随后显著下降($P<0.05$)。肝胰腺蛋白酶活性则在C0.75组最高,显著高于其他各组($P<0.05$)。

2.4 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾血淋巴液抗氧化能力的影响

由表6可知,与血淋巴液MDA含量相反,克氏原螯虾血淋巴液中SOD活性随着饲料胆固醇水平由0增加到0.50%而显著上升($P<0.05$),但随着饲料胆固醇水平继续增加而显著下降($P<0.05$)。克氏原螯虾血淋巴液CAT活性在C0组

显著低于除 C0.25 组外的其他各组 ($P<0.05$)。 ($P<0.05$)。

C0.25 组血淋巴液 GSH 含量显著高于其他各组

表 4 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾体组成的影响(鲜重基础)

Table 4 Effects of dietary cholesterol level on body components of *Procambarus clarkii* (fresh weight basis) %

项目 Items	组别 Groups					P 值 P-value
	C0	C0.25	C0.50	C0.75	C1.0	
水分 Moisture	69.72±2.59	70.94±1.85	69.80±1.51	69.51±1.52	68.44±0.46	0.894
粗脂肪 Crude lipid	2.84±0.04 ^a	2.85±0.03 ^a	3.09±0.04 ^b	3.06±0.06 ^b	3.18±0.04 ^b	0.001
粗蛋白质 Crude protein	9.90±0.33	10.31±0.17	10.40±0.17	10.17±0.15	9.75±0.15	0.209
粗灰分 Ash	9.99±0.31	10.90±0.68	10.63±0.79	11.27±0.50	10.80±0.52	0.647
钙 Ca	2.96±0.09	2.95±0.07	2.92±0.07	3.09±0.02	3.00±0.02	0.337

表 5 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾组织消化酶活性的影响

Table 5 Effects of dietary cholesterol level on digestive enzyme activities in tissue of *Procambarus clarkii*

项目 Items	组别 Groups					P 值 P-value
	C0	C0.25	C0.50	C0.75	C1.00	
肝胰腺 Hepatopancreas						
脂肪酶 LPS	1.51±0.14 ^d	2.86±0.12 ^{bc}	5.33±0.01 ^a	3.18±0.03 ^b	2.70±0.01 ^c	<0.001
蛋白酶 PR	647.41±17.09 ^d	784.60±36.86 ^{cd}	900.79±13.09 ^{bc}	118.77±46.45 ^a	926.58±21.91 ^b	<0.001
淀粉酶 AMS	0.82±0.01	0.84±0.02	0.85±0.04	0.81±0.03	0.85±0.03	0.764
胃 Stomach						
脂肪酶 LPS	2.70±0.02 ^c	3.98±0.12 ^{bc}	6.08±0.31 ^a	4.83±0.38 ^b	3.25±0.15 ^c	<0.001
蛋白酶 PR	857.11±15.53 ^c	173.74±33.24 ^{ab}	213.36±31.38 ^a	138.04±9.98 ^{ab}	1082.35±16.27 ^b	<0.001
淀粉酶 AMS	1.20±0.05	1.25±0.06	1.28±0.08	1.28±0.06	1.16±0.03	0.513
肠道 Intestine						
脂肪酶 LPS	1.78±0.07 ^c	2.51±0.14 ^{abc}	4.18±0.38 ^a	3.74±0.01 ^a	3.26±0.47 ^b	<0.001
蛋白酶 PR	454.84±26.20 ^c	782.14±21.42 ^{ab}	870.05±41.37 ^a	707.39±11.29 ^b	672.99±13.51 ^b	<0.001
淀粉酶 AMS	1.22±0.06	1.30±0.02	1.35±0.02	1.19±0.04	1.28±0.09	0.297

表 6 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾血淋巴液抗氧化能力的影响

Table 6 Effects of dietary cholesterol level on antioxidant capability in blood lymphocyte of *Procambarus clarkii*

项目 Items	组别 Groups					P 值 P-value
	C0	C0.25	C0.50	C0.75	C1.00	
超氧化物歧化酶 SOD/(U/mL)	41.72±2.17 ^a	46.89±2.49 ^{ab}	53.00±0.52 ^c	47.77±3.14 ^b	45.59±2.06 ^{ab}	0.002
过氧化氢酶 CAT/(U/mL)	5.16±1.15 ^a	6.19±0.42 ^{ab}	7.96±0.64 ^b	7.74±1.25 ^b	6.90±0.57 ^b	0.006
丙二醛 MDA/(nmol/mL)	4.79±0.06 ^a	2.71±0.12 ^{bc}	2.29±0.04 ^c	2.97±0.08 ^{bc}	3.18±0.32 ^b	<0.001
谷胱甘肽 GSH/(μmol/mL)	3.41±0.23 ^a	6.65±0.26 ^c	4.80±0.45 ^b	4.89±0.35 ^b	2.74±0.56 ^a	<0.001

2.5 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾肝胰腺脂代谢相关基因表达的影响

由图 2 可知,肝胰腺 *CPT- I* mRNA 相对表达量随着饲料胆固醇水平增加而不断下降,C0 组显

著高于其他各组 ($P<0.05$) (图 2-A)。C0.25 组肝胰腺 *FAS* mRNA 相对表达量显著低于 C0.75、C1.00 组 ($P<0.05$) (图 2-B)。肝胰腺 *FABP* 与 *FATP* mRNA 相对表达量随着饲料胆固醇水平的

增加先上升,随后又下降。肝胰腺 *FATP* mRNA 相对表达量在 C0.75 组最高显著高于 C0 组 ($P <$

0.05), 而 *FABP* mRNA 相对表达量在 C0.50 组最高, 显著高于 C0 组 ($P < 0.05$) (图 2-C 和图 2-D)。

数据柱形标注不同字母表示差异显著 ($P < 0.05$)。Value bars with different letters mean significant difference ($P < 0.05$)。

图 2 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾肝胰腺脂代谢相关基因表达的影响

Fig.2 Effects of dietary cholesterol level on lipid-metabolism related gene expression in hepatopancreas of *Procambarus clarkii*

3 讨论

3.1 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾生长性能的影响

饲料中添加适宜水平的胆固醇能显著提高甲壳类动物的生长性能^[10-11]。通过折线模型分析发现,凡纳滨对虾 (*Litopenaeus vannamei*) 胆固醇的最适需要量为 0.16%^[12];在日本沼虾 (*Macrobrachium nipponense*) 饲料中添加 0.9% 的胆固醇,能够得到较高的生长性能和较低饵料系数^[13]。在红螯螯虾 (*Cherax quadricarinatus*) 的研究中也发现饲料中过低或过高的胆固醇水平均不利于其生长^[14]。虾、蟹等甲壳动物已被证明不能从头合成胆固醇^[2],必须摄入外源性胆固醇来维持正常生理机能。因此,饲料中合理补充胆固醇对甲壳动物的生存和生长至关重要,过低或者过高的胆固醇添加水平都会影响甲壳动物的生长。为了节约鱼粉等资源,水产饲料中植物性饲料原料越来越受到广泛使用。相比于以鱼粉等动物蛋白质源为主的饲料,以植物性蛋白质源为主的饲料导致了

虾蟹等甲壳动物机体内胆固醇水平的缺乏^[12]。胆固醇是脂蛋白的重要组成部分,体内过低的胆固醇水平不利于脂质在动物体内的吸收和运输^[15]。作为类脂的一种,胆固醇还是动物细胞膜的组成成分,为细胞膜提供结构的完整性,以抵抗环境压力,如高温和盐胁迫^[16]。过低的胆固醇水平使得甲壳动物抵抗外界环境条件变化的能力减弱。此外,胆固醇是蜕皮激素的前体,过低的胆固醇水平使得甲壳动物无法合成蜕皮激素,影响正常的蜕皮,进而影响生长性能甚至造成死亡。但是过量的胆固醇不仅对生长性能没有促进作用,还会增加饲料成本。

3.2 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾各组织消化酶活性的影响

甲壳动物消化酶活性反映其对饲料营养成分的吸收能力,活性越高吸收能力越强,对饲料的利用率越高,而不同消化酶活性受到其摄食的饲料不同营养成分的水平及来源的影响^[17]。本试验中,饲料中胆固醇水平对克氏原螯虾各组织的淀粉酶活性无显著差异,且淀粉酶活性维持在较低的水平,表明克氏原螯虾对糖的吸收利用能力较

弱。随着饲料胆固醇水平从 0 增加到 0.50%, 肝胰腺、胃以及肠道的脂肪酶和蛋白酶活性显著上升, 但随着胆固醇水平的继续增加而显著下降。这不仅表明克氏原螯虾对饲料中蛋白质和脂肪的利用水平较高, 也表明饲料中适宜的胆固醇水平能够提高克氏原螯虾各组织中脂肪酶和蛋白酶的活性。这与甘信辉^[18]在雄性红螯螯虾和韩冰^[19]在半滑舌鳎 (*Cynoglossus semilaevis*) 上的研究结果一致。饲料中 0.54% 的胆固醇水平有助于提高脂肪酶与蛋白酶的活性, 而过量的胆固醇则会影响克氏原螯虾体内正常的营养物质代谢, 影响其消化酶的活性, 进而对其生长有一定的影响。此外, 在肝胰腺和胃中蛋白酶活性达到 1 000 U/mg prot, 而在肠道中则小于 900 U/mg prot, 表明克氏原螯虾对饲料蛋白质的消化主要在胃部组织及肝胰腺中。

3.3 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾体组成的影响

本试验发现, 饲料中胆固醇水平对克氏原螯虾的水分、粗蛋白质、粗灰分和钙含量并未造成显著影响, 但随着胆固醇水平不断增加, 克氏原螯虾粗脂肪含量显著增加, 表明饲料中适当的胆固醇能够促进脂肪的吸收, 增加脂肪沉积。Thongrod 等^[20]在墨吉对虾 (*Penaeus merguensis*) 的研究中发现当饲料胆固醇水平增加时, 全虾粗脂肪含量呈上升趋势, 而粗蛋白质、粗灰分含量无显著变化, 与本试验研究结果一致。在对斜带石斑鱼 (*Epinephelus coioides*)^[21]、大菱鲆 (*Scophthalmus maximus*)^[22] 的研究中也有关于饲料中添加胆固醇促进水产动物体内粗脂肪含量增加的报道。张武财等^[21]对斜带石斑鱼的研究发现, 添加胆固醇组的试验鱼肝脏中 CPT- I 活性显著低于对照组 (未添加胆固醇), 并且试验组肝脏苹果酸酶 (malic enzyme, ME) 活性有升高的趋势。肝脏 CPT- I 的作用是催化脂酰辅酶 A 转化为脂酰肉碱, 并将脂酰肉碱运送到线粒体基质进行 β -氧化, 是体内脂肪酸 β -氧化分解的关键酶^[23]。肝脏 ME 的作用是在脂肪酸合成中提供烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 (NADPH), 是脂肪酸合成中的关键酶。由此推测, 斜带石斑鱼体内脂肪含量随着饲料胆固醇水平的增加而增加是因为胆固醇促进了鱼体肝脏脂肪酸的合成, 并降低了肝脏脂肪酸的分解。本试验中也发现了随着饲料胆固醇水平的升高, CPT- I mRNA 相对表达量显著下降, 因此推测克

氏原螯虾粗脂肪含量的上升可能也与此有关。

3.4 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾血淋巴液抗氧化能力的影响

SOD、CAT 能够清除体内多余的自由基, 减少细胞的氧化损伤^[24]。MDA 被认为是过氧化作用的分解产物, 其水平可反映肝脏损伤的程度^[25]。GSH 能帮助保持正常的免疫系统功能, 并具有抗氧化和解毒作用^[26]。Tao 等^[27]在中华绒螯蟹 (*Eriocheir sinensis*) 的研究中发现随着饲料胆固醇添加水平的上升, 除去胃肠组织后的机体内 SOD 活性呈先上升后下降的趋势。而 Han 等^[28]在研究饲料胆固醇添加水平对三疣梭子蟹 (*Portunus trituberculatus*) 幼体生长、蜕皮和抗氧化的影响时发现, 随着饲料胆固醇添加水平的上升, 血清 SOD 活性也随之上升。Gu 等^[13]在研究胆固醇对日本沼虾幼虾生长、饲料系数、体组成及抗氧化指标的影响时发现肝脏 CAT 活性、MDA 和 GSH 含量的变化也有类似的结果。本试验中, 克氏原螯虾血淋巴液中 SOD 活性随着饲料胆固醇水平由 0 增加到 0.50% 而显著上升, 但随着饲料胆固醇水平继续增加而显著下降。血淋巴液中 MDA 含量则与 SOD 活性呈现相反的趋势。克氏原螯虾血淋巴液中 CAT 活性在未添加胆固醇组显著下降。这表明饲料中适量的胆固醇能够提高克氏原螯虾的血淋巴液中抗氧化能力, 而过量的胆固醇则可能降低机体的抗氧化性能。因此, 饲料中添加胆固醇不仅可以为甲壳动物提供机体必要的胆固醇来源, 还可以作为甲壳动物一种抗氧化剂^[29]。

3.5 饲料胆固醇水平对克氏原螯虾肝胰腺脂代谢相关基因表达的影响

机体脂肪含量受到脂肪合成和脂肪分解 2 个代谢过程的影响^[30]。当机体需能时, 储存的脂肪首先被分解为甘油和脂肪酸, 随后脂肪酸在 CPT- I 的催化下进行 β -氧化分解为机体提供能量。CPT- I 是在脂肪酸氧化过程中关键酶, 调控脂肪的分解^[31]。本试验发现, 与 C0 组相比, C0.50 组~C1.00 组中肝胰腺 CPT- I mRNA 相对表达量下降, 该结果与虾体的粗脂肪含量结果正好相反。这表明饲料胆固醇水平能够影响机体脂肪代谢过程, 胆固醇含量升高会下调 CPT- I 的 mRNA 相对表达量, 导致脂肪酸 β -氧化水平的下降, 这可能就是导致胆固醇水平为 0.50%、0.75% 和 1.00% 这 3 组克氏原螯虾体内粗脂肪含量显著

增加的原因之一。

FAS 是脂肪酸合成的关键酶,在肝脏中以复杂的七步反应将乙酰辅酶 A 和丙二酰辅酶 A 合成长链脂肪酸^[32]。FABP 属于脂质结合蛋白超家族,是分子质量较小的蛋白质,参与细胞内脂肪酸的运输,可与游离脂肪酸结合,特别是与长链脂肪酸有很高的结合能力^[33]。FATP 参与脂肪酸的转运,与 FATP 结合的脂肪酸能够从细胞膜被运送到下一位置进行代谢^[34]。本试验中,胆固醇高水平组肝胰腺 FAS、FABP 与 FATP 的 mRNA 相对表达量高于胆固醇低水平组,表明高胆固醇水平会增加克氏原螯虾脂肪酸的合成,提高脂肪酸尤其是长链脂肪酸的结合与转运能力,从而促进脂肪的沉积,因此,FAS、FABP 与 FATP 的 mRNA 相对表达量的升高可能也是 0.50%、0.75% 和 1.00% 这 3 组克氏原螯虾体内粗脂肪含量显著增加的原因之一。

4 结 论

① 饲料中添加胆固醇能够促进克氏原螯虾的生长,提高消化组织的脂肪酶活性。

② 过量的胆固醇会通过抑制脂肪的 β -氧化,导致克氏原螯虾的脂肪分解水平下降,并通过增加长链脂肪酸的转运促进脂肪沉积,最终引起机体脂肪含量的增加。

③ 过低或过量的胆固醇均会降低克氏原螯虾血淋巴液抗氧化能力。

④ 本试验中克氏原螯虾饲料的胆固醇适宜添加水平为 0.50%,此时饲料胆固醇实测水平为 0.54%。

参考文献:

- [1] 王艳辉,张洪友,杨威,等.胆固醇在哺乳动物体内的代谢调节[J].现代畜牧兽医,2016(11):53-57.
WANG Y H,ZHANG H Y,YANG W,et al.Regulation of cholesterol metabolism in mammalian[J].Modern Journal of Animal Husbandry and Veterinary Medicine,2016(11):53-57.(in Chinese)
- [2] TESHIMA S I,KANAZAWA A.Biosynthesis of sterols in the lobster, *Panulirus japonica*, the prawn, *Penaeus japonicus*, and the crab, *Portunus trituberculatus*[J].Comparative Biochemistry and Physiology Part B:Comparative Biochemistry,1971,38(3):597-602.
- [3] 徐宇,许志强,黄鸿兵,等.江苏小龙虾产业发展历程、现状和展望[J].水产养殖,2021,42(10):77-80.
XU Y,XU Z Q,HUANG H B,et al.Development history,present situation and prospect of *Procambarus clarkii* industry in Jiangsu[J].Journal of Aquaculture,2021,42(10):77-80.(in Chinese)
- [4] 史振鹏,王爱民,陈开健,等.克氏原螯虾营养与饲料的研究进展[J].盐城工学院学报(自然科学版),2019,32(2):52-56.
SHI Z P,WANG A M,CHEN K J,et al.Research progress on nutrition and feed of *Procambarus clarkii*[J].Journal of Yancheng Institute of Technology(Natural Science Edition),2019,32(2):52-56.(in Chinese)
- [5] KUMAR V,SINHA A K,ROMANO N,et al.Metabolism and nutritive role of cholesterol in the growth,gonadal development, and reproduction of crustaceans[J].Reviews in Fisheries Science & Aquaculture,2018,26(2):254-273.
- [6] HAN T,WANG J T,LI X Y,et al.Effects of dietary phospholipid and cholesterol levels on growth and fatty acid composition of juvenile swimming crab, *Portunus trituberculatus*[J].Aquaculture Nutrition,2018,24(1):164-172.
- [7] TIAN H Y,YANG C C,YU Y B,et al.Dietary cholesterol level affects growth,molting performance and ecdysteroid signal transduction in *Procambarus clarkii*[J].Aquaculture,2020,523:735198.
- [8] ZHENG P Q,WANG J T,HAN T,et al.Effect of dietary cholesterol levels on growth performance,body composition and gene expression of juvenile mud crab *Scylla paramamosain*[J].Aquaculture Research,2018,49(10):3434-3441.
- [9] YUN B,MAI K S,ZHANG W B,et al.Effects of dietary cholesterol on growth performance,feed intake and cholesterol metabolism in juvenile turbot (*Scophthalmus maximus* L.) fed high plant protein diets[J].Aquaculture,2011,319(1/2):105-110.
- [10] 汪留全,李海洋,胡王,等.饲料中胆固醇水平对幼蟹生长和饲料利用率影响的研究[J].淡水渔业,2004,34(1):13-15.
WANG L Q,LI H Y,HU W,et al.Effect of cholesterol content on growth and feed-absorbed ratio of juvenile crab[J].Freshwater Fisheries,2004,34(1):13-15.(in Chinese)
- [11] YAN M L,WANG W L,HUANG X X,et al.Interac-

- tive effects of dietary cholesterol and phospholipids on the growth performance, expression of immune-related genes and resistance against *Vibrio alginolyticus* in white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) [J]. *Fish & Shellfish Immunology*, 2020, 97: 100–107.
- [12] ZHANG W, YANG Q H, TAN B P, et al. Study of the requirements of dietary cholesterol at two different growth stages of Pacific white shrimps, *Litopenaeus vannamei* [J]. *Aquaculture International*, 2019, 27 (6): 1583–1597.
- [13] GU X Z, FU H T, SUN S M, et al. Effects of cholesterol on growth, feed utilization, body composition and immune parameters in juvenile oriental river prawn, *Macrobrachium nipponense* (De Haan) [J]. *Aquaculture Research*, 2017, 48(8): 4262–4271.
- [14] HERNÁNDEZ P V, OLVERA-NOVOA M A, ROUSE D B. Effect of dietary cholesterol on growth and survival of juvenile redclaw crayfish *Cherax quadricarinatus* under laboratory conditions [J]. *Aquaculture*, 2004, 236(1/2/3/4): 405–411.
- [15] YEPIZ-PLASCENCIA G, VARGAS-ALBORES F, HIGUERA-CIAPARA I. Penaeid shrimp hemolymph lipoproteins [J]. *Aquaculture*, 2000, 191 (1/2/3): 177–189.
- [16] YANG S T, KREUTZBERGER A J B, LEE J, et al. The role of cholesterol in membrane fusion [J]. *Chemistry and Physics of Lipids*, 2016, 199: 136–143.
- [17] 杨志刚, 阙有清, 纪连元, 等. 以配合饲料替代杂鱼对中华绒螯蟹生长及消化酶活性的影响 [J]. *大连海洋大学学报*, 2013, 28(3): 293–297.
- YANG Z G, QUE Y Q, JI L Y, et al. Effects of replacement of trash fish with formulated feed on growth and digestive enzyme activities in Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* [J]. *Journal of Dalian Fisheries University*, 2013, 28(3): 293–297. (in Chinese)
- [18] 甘信辉. 脂类营养对雄性红螯光壳螯虾生长和生殖的影响研究 [D]. 硕士学位论文. 上海: 华东师范大学, 2010.
- Gan X H. Effects of lipid nutrition on growth and reproduction in male redclaw crayfish, *Cherax quadricarinatus* [D]. Master's Thesis. Shanghai: East China Normal University, 2010. (in Chinese)
- [19] 韩冰. 大豆卵磷脂、胆固醇及其交互作用对半滑舌鳎 (*Cynoglossus semilaevis* Günther) 稚鱼生长、消化酶活力及相关基因表达的影响 [D]. 硕士学位论文. 青岛: 中国海洋大学, 2013: 34–35.
- HAN B. Effects of dietary phospholipid, cholesterol and their interactions on growth performance, digestive enzymes and expression of related gene of tongue sole (*Cynoglossus semilaevis* Günther) larvae [D]. Master's Thesis. Qingdao: Ocean University of China, 2013: 34–35. (in Chinese)
- [20] THONGROD S, BOONYARATPALIN M. Cholesterol and lecithin requirement of juvenile banana shrimp, *Penaeus merguensis* [J]. *Aquaculture*, 1998, 161 (1/2/3/4): 315–321.
- [21] 张武财, 董晓慧, 谭北平, 等. 饲料胆固醇含量对斜带石斑鱼生长性能、组织生化指标和肝脏脂肪代谢相关酶活性的影响 [J]. *动物营养学报*, 2016, 28(6): 1945–1955.
- ZHANG W C, DONG X H, TAN B P, et al. Effects of dietary cholesterol content on growth performance, tissue biochemical indices and liver lipid metabolism related enzyme activities of orange-spotted grouper (*Epinephelus coioides*) [J]. *Chinese Journal of Animal Nutrition*, 2016, 28(6): 1945–1955. (in Chinese)
- [22] ZHU T F, AI Q H, MAI K S, et al. Feed intake, growth performance and cholesterol metabolism in juvenile turbot (*Scophthalmus maximus* L.) fed defatted fish meal diets with graded levels of cholesterol [J]. *Aquaculture*, 2014, 428/429: 290–296.
- [23] 施海萌, 张婕, 周晓庆, 等. 肉毒碱棕榈酰转移酶-II 异常与脂代谢相关疾病研究进展 [J]. *南通大学学报 (医学版)*, 2019, 39(1): 60–64.
- SHI H M, ZHANG J, ZHOU X Q, et al. Advances on abnormality of carnitine palmitoyl transferase-II activity with fatty metabolic related-diseases [J]. *Journal of Nantong University (Medical Sciences)*, 2019, 39(1): 60–64. (in Chinese)
- [24] 崔青曼, 袁春营, 吴福西. 中国水产动物免疫学研究进展 [J]. *河北渔业*, 1999(4): 9–10.
- CUI Q M, YUAN C Y, WU F X. Research progress of aquatic animal immunology in China [J]. *Hebei Fisheries*, 1999(4): 9–10. (in Chinese)
- [25] MARTÍNEZ-ALVAREZ R M, HIDALGO M C, DOMÉZAIN A, et al. Physiological changes of sturgeon *Acipenser naccarii* caused by increasing environmental salinity [J]. *Journal of Experimental Biology*, 2002, 205 (Pt.23): 3699–3706.
- [26] 王小巍, 张红艳, 刘锐, 等. 谷胱甘肽的研究进展 [J]. *中国药理学杂志 (网络版)*, 2019, 17(4): 141–148.
- WANG X W, ZHANG H Y, LIU R, et al. Progress in research of glutathione [J]. *Chinese Journal of Pharmacology (Online Edition)*, 2019, 17(4): 141–148.

- (in Chinese)
- [27] TAO X, WANG C, WEI H, et al. Effects of dietary cholesterol levels on moulting performance, lipid accumulation, ecdysteroid concentration and immune enzymes activities of juvenile Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* [J]. *Aquaculture Nutrition*, 2014, 20(5):467-476.
- [28] HAN T, WANG J T, LI X Y, et al. Effects of dietary cholesterol levels on the growth, molt performance, and immunity of juvenile swimming crab, *Portunus trituberculatus* [J]. *Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh*, 2015, 67:1191.
- [29] 左玉, 李鹏鸽, 谢文磊. 胆固醇在复杂体系中的抗氧化作用[J]. *食品与发酵工业*, 2014, 40(8):100-108.
- ZUO Y, LI P G, XIE W L. The study of antioxidant activities of cholesterol in complicated systems [J]. *Food and Fermentation Industries*, 2014, 40(8):100-108. (in Chinese)
- [30] YU H, LIANG H L, REN M C, et al. A study to explore the effects of low dietary protein levels on the growth performance and nutritional metabolism of grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) fry [J]. *Aquaculture*, 2022, 546:737324.
- [31] PENG M, XU W, MAI K S, et al. Growth performance, lipid deposition and hepatic lipid metabolism related gene expression in juvenile turbot (*Scophthalmus maximus* L.) fed diets with various fish oil substitution levels by soybean oil [J]. *Aquaculture*, 2014, 433:442-449.
- [32] TIAN J J, JI H, OKU H, et al. Effects of dietary arachidonic acid (ARA) on lipid metabolism and health status of juvenile grass carp, *Ctenopharyngodon idellus* [J]. *Aquaculture*, 2014, 430:57-65.
- [33] DING L Y, JIN M, SUN P, et al. Cloning, tissue expression of the fatty acid-binding protein (Pt-FABP1) gene, and effects of dietary phospholipid levels on *FABP* and vitellogenin gene expression in the female swimming crab *Portunus trituberculatus* [J]. *Aquaculture*, 2017, 474:57-65.
- [34] TORSTENSEN B E, NANTON D A, OLSVIK P A, et al. Gene expression of fatty acid-binding proteins, fatty acid transport proteins (cd36 and FATP) and β -oxidation-related genes in Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) fed fish oil or vegetable oil [J]. *Aquaculture Nutrition*, 2009, 15(4):440-451.

Effects of Dietary Cholesterol Level on Growth Performance, Digestive Enzyme Activities, Antioxidant Capability and Lipid Metabolism Related Gene Expression of *Procambarus clarkii*

TIAN Hongyan¹ YANG Chengcong¹ ZHANG Chunnuan² WANG Aimin^{1*} LIU Fei¹
YANG Wenping¹ YU Yebing¹ REN Shengjie¹ ZHANG Wuxiao¹

(1. College of Marine and Bioengineering, Yancheng Institute of Technology, Yancheng 224000, China; 2. College of Animal Science and Technology, Henan University of Science and Technology, Luoyang 471023, China)

Abstract: In order to study the effects of dietary cholesterol level on the growth performance, body composition, digestive enzyme activities, antioxidant capacity and lipid metabolism related gene expression of *Procambarus clarkii* (*P. clarkii*), five diets with different levels of cholesterol (0, 0.25%, 0.50%, 0.75% and 1.00%) were designed and used in the present study. The measured cholesterol levels in the diets were 0.06%, 0.29%, 0.54%, 0.81% and 1.05%, respectively. A total of 225 *P. clarkii* with similar sizes [initial weight = (4.4±0.1) g] were randomly divided into 5 groups with 3 replicates in each group, and each replicate contained 15 shrimp tanks. After 6 weeks' feeding trial, samples were collected and tested. The results showed as follows: 1) with the increasing of the dietary cholesterol level from 0 to 0.50%, the weight gain rate and lipase activity in the hepatopancreas, stomach and intestines of *P. clarkii* increased significantly ($P<0.05$), but decreased significantly as the dietary cholesterol level increasing from 0.50% to 1.00% ($P<0.05$). Dietary cholesterol level had no significant effects on the whole-body moisture, crude protein, ash and calcium contents among all groups ($P>0.05$). However, the crude fat content was significantly lower in the *P. clarkii* fed dietary containing less than 0.50% cholesterol ($P<0.05$). 2) In contrast to the malondialdehyde (MDA) content, superoxide dismutase (SOD) activity in blood lymphocyte of *P. clarkii* increased significantly with the dietary cholesterol level increasing from 0 to 0.50% ($P<0.05$), but then decreased significantly with the increasing dietary cholesterol level ($P<0.05$). 3) Compared with group C0, the mRNA relative expression level of carnitine palmitoyltransferase- I (CPT- I) in hepatopancreas decreased significantly with the dietary cholesterol level increasing ($P<0.05$). The mRNA relative expression levels of fatty acid-binding protein (FABP) and fatty acid transport protein (FATP) in hepatopancreas increased significantly ($P<0.05$) in the *P. clarkii* fed diet with cholesterol. In conclusion, *P. clarkii* fed diet with 0.50% cholesterol level can obtain the enhanced growth performance and lipase activity. Dietary cholesterol might affect the lipid metabolism through suppressing the β -oxidation and promoting the transport of fatty acids. In addition, low or excessive cholesterol both can reduce the antioxidant capacity in the blood lymphocyte of *P. clarkii*. Taken above, the dietary cholesterol suitable supplemental level for *P. clarkii* is 0.50% in this experiment, while the cholesterol measured level in the diet is 0.54%. [Chinese Journal of Animal Nutrition, 2022, 34(7):4630-4641]

Key words: *Procambarus clarkii*; cholesterol; growth; lipid metabolism; antioxidation